


POHLAVNÍ NEMOCI STŘEDOČESKÝ KRAJ ROK 2014



Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje:
Václava Zvolská

Datum zpracování: 17.04.2015

Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji rok 2014

Zdrojem informací této výroční zprávy je povinné „**Hlášení pohlavní nemoci**“, které je povinno vyplnit dermatovenerologické či zdravotnické pracoviště, které onemocnění diagnostikovalo. Jednotlivá hlášení jsou následně prostřednictvím Krajských hygienických stanic, dle místa bydliště nemocných, zaznamenávána do Národního registru pohlavních nemocí (RPN).

Povinnému hlášení podléhají tyto pohlavní nemoci dle MKN-10:

- vrozená syfilis (dg. A50)
- časná syfilis (dg. A51)
- pozdní syfilis (dg. A52)
- jiná a neurčená syfilis (dg. A53)
- gonokoková infekce (dg. A54)
- lymphogranuloma venerum (dg. A55)
- chancroid – ulcus molle (dg. A57)

Ostatní infekce přenosné pohlavním stykem, která nejsou předmětem hlášení do RPN, sledují jiné informační systémy (EPIDAT). RPN zaznamenává tato onemocnění pouze v kombinaci s některou z výše uvedených povinně hlášených dg.

RPN spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a zpracovatelem je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Od KSRZIS přejímá data k dalšímu zpracování Centrální pracoviště ÚZIS ČR.

Jedna osoba může mít v průběhu roku hlášeno více případů stejného druhu onemocnění nebo různých pohlavních nemocí. Počet hlášení tak převyšuje celkový počet nakažených osob.

V průběhu roku **2014** bylo ve Středočeském kraji evidováno Registrem pohlavních nemocí **211 případů** pohlavních onemocnění (nemocnost činila 16,3/100 000 obyvatel). V 87 případech se jednalo o onemocnění syfilis (dg. A50 – A53), v 121 případě o onemocnění kapavkou, tj. gonokokovou infekcí (dg. A54) a ve 3 případech o onemocnění lymphogranuloma venerum (dg. A55). Onemocnění chancroid (dg. A57) nebylo v roce 2014 zaznamenáno.

Onemocnění hlášena ze všech okresů kraje. Téměř tři čtvrtiny (77,7 %) se týkaly mužů a 32 případů (15,2 %) onemocnění bylo zjištěno u cizinců. Oproti roku 2013, kdy bylo hlášeno 200 případů, se celkově jedná o **vzestup onemocnění o 5,5 %**, oproti 5letému průměru vzestup o 18,5 %. Oproti 5letému průměru dochází v tomto roce u syfilis k **poklesu** a to o **1,1 %**. U gonokokových infekcí oproti 5letému průměru došlo k **vzestupu o 35,3 %**.

U 5 osob zjištěno současně onemocnění syfilitidou i gonokokovou infekcí, u 1 osoby koinfekce kapavky a lymphogranulomu venerum.

1. Syfilis

Celkem hlášeno **87 případů** onemocnění, celokrajská nemocnost činí 6,7/100 000 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2013, kdy hlášeno 69 případů onemocnění stoupl počet onemocnění u syfilis o 26,1 %.

Onemocnění hlášena ze všech okresů kraje mimo okres Rakovník. Nejvyšší nemocnost zaznamenána v okresech Beroun (12,6) a Praha západ (12,5/100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost ve věkové skupině 25-34 let (17,6/100 000 obyvatel). Z celkového počtu onemocnělo 65 mužů (74,7 %) a 22 žen (25,3 %). Oproti loňskému roku, kdy muži tvořili 63,8 % a ženy 36,2 %, dochází u mužů k vzestupu a u žen k poklesu počtu případů. V 21 případech proběhla onemocnění u cizinců (24,1 %), zde dochází k vzestupu na rozdíl od loňského roku, kdy cizinci tvořili 21,7 % s absolutním počtem 15 případů.

Jelikož se šíření sexuálně přenosných chorob úzce váže na sociální chování jedince, významný faktor ovlivňující pravděpodobnost nákazy představuje sexuální orientace a sexuálně rizikové chování. V poloviční většině případů (46,0 %) proběhl přenos onemocnění mezi heterosexuály. V 34,5 % udáván homosexuální, v 11,5 % se jednalo o bisexuální kontakt a ve zbývajících 8,0 % případů nebyla sexuální orientace zjištěna. Prostituce byla přiznána v 1 případě (1,0 %) a promiskuita ve 2 případech (2,0 %). Ve 43 případech (43,5 %) hlášení byl uveden náhodný styk, jiné sexuální chování uvedlo 33 nemocných (33,3 %) a u 20 nemocných (20,2 %) sexuální chování nezjištěno. U zadání možností sexuálního chování lze vybrat více variant, v roce 2014 se jedná o 99 vyplněných možností.

Většina případů onemocnění syfilis (98,8 %) byla léčena, naopak 1,2 % nebylo léčeno vůbec. V rámci hospitalizace léčeno 73 osob, 13 osob léčeno ambulantně a 1 osoba neléčena (IUD).

Zdroj onemocnění se podařilo objasnit u 19 nemocných, u 44 nemocných byly udány kontakty. Syfilis byla v roce 2014 zjištěna (z celkového počtu 22) u 7 gravidních žen (31,8 %), z toho se v 2 případech jednalo o cizinky. HIV pozitivita zjištěna ve 13 případech (14,9 %), postižení jsou pouze muži, občané ČR, ve všech případech onemocnění hlášena v kombinaci s jinou sexuálně přenosnou nemocí.

Onemocnění syfilis se člení do 4 trímístných diagnóz podle způsobu nákazy a především stádia. Vzácně se vyskytující **vrozená syfilis** nebyla v roce 2014 hlášena. **Časná forma syfilis**, které bývají diagnostikovány nejčastěji, tvoří 70,2 % ze všech zjištěných onemocnění syfilis. Do roku 2010 byl zaznamenáván vzestupný trend onemocnění touto formou, od roku 2011 dochází k poklesu, v roce 2013 na 48 případů, ale v letošním roce dochází opět k vzestupu na 61 případů (oproti roku 2013 vzestup o 27,1 %). U **pozdního stádia syfilis** zaznamenáno 15 případů (17,2 %) a v porovnání s loňským rokem, kdy hlášeno 13 případů, došlo k vzestupu počtu onemocnění o 15,4 %. Jako **jiná nebo neurčená forma syfilis** bylo v roce 2014 diagnostikováno zbývajících 12,6 % (11 případů) onemocnění.

2. Gonokokové infekce

Celkem hlášen **121 případ** onemocnění, celokrajská nemocnost činí 9,4/100 000 obyvatel. Oproti roku 2013, kdy hlášeno 131 případů onemocnění, došlo k poklesu o 7,6 %. V 96,7 % případů kapavky se jednalo o akutní formu (117 případů) a chronická onemocnění představovala pouze 3,3 % (4 případy).

Nejvyšší nemocnost zaznamenána v okresech Praha východ (15,4) a Kladno (12,5/100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost zaznamenána, shodně jako v loňském roce, ve věkové skupině 15 - 24 let (31,3/100 000 obyvatel).

Z celkového počtu onemocnělo 96 mužů (79,3 %) a 25 žen (20,7 %). Oproti loňskému roku, kdy muži tvořili 74,8 % a ženy 25,2 %, dochází u mužů k mírnému vzestupu počtu onemocnění a u žen k poklesu.

11 případů onemocnění zaznamenáno u cizinců (9,1 %).

Z hlediska sexuálně rizikového chování a sexuální orientace se ve většině případů (71,9 %) jedná o přenos heterosexuální, ve 21,5 % udáván homosexuální a v 5,0 % bisexuální kontakt. V 1,6 % sexuální zaměření jiné.

Promiskuita byla přiznána celkově v 7,1 % (7 mužů a 2 ženy). V 53,5 % hlášení byl uveden předchozí náhodný styk (68 případů). Náhodný pohlavní styk uvádějí muži 5x častěji než ženy (57 mužů, 11 žen). Jiné sexuální chování uváděno u 28 mužů a 12 žen tj. 40 osob (31,5 %), a v 10 případech (7,9 %) nebylo sex. chování uvedeno (8 mužů, 2 ženy). U zadání možností sexuálního chování lze vybrat více variant, v roce 2014 se jedná o 127 vyplněných možností.

U kapavky, na rozdíl od syfilis, bylo ambulantně léčeno 98 osob (81,0 %) a 22 osob bylo hospitalizováno 18,2 % a 1 osoba léčena nebyla 0,8 %.

31 případů onemocnění hlášeno v kombinaci s jinou sexuálně přenosnou nemocí.

U 6 osob došlo u gonokové infekce k onemocnění více orgánů: u 4 osob při postižení dolního pohl. a močového ústrojí bez abscesu (dg. A54.0) zjištěna ve 3 případech (2 ženy, 1 muž) gonokoková faryngitida (dg. A54.5), v 1 případě u muže gonokoková faryngitida společně s infekcí řiti a rekta (dg. A54.6). U 2 mužů s gonokokovou faryngitidou (dg. A54.5) byla zjištěna infekce řiti a rekta (dg. A54.6).

Zdroj onemocnění se podařilo objasnit u 20 nemocných, u 39 nemocných byly udány kontakty. HIV pozitivita zjištěna u 8 mužů – 1 cizinec, 7 občanů ČR. Gravidní žena s kapavkou nebyla v roce 2014 zjištěna.

3. Lymphogranuloma venerum

Hlášeny **3 případy** u občanů ČR (v roce 2013 onemocnění nehlášeno). Ve všech případech (25letý muž z okresu Příbram a 2 muži z okresu Mladá Boleslav – 34 a 48 let) se jedná o homosexuály. Ve všech případech proběhla léčba ambulantně u všech onemocnění kombinováno s jiným onemocněním - ve 2 případech se jedná o HIV pozitivní osoby, v 1 případě kombinace s dg. A56. Všichni dispenzarizováni na kožním odd. NNB. K přenosu nákazy došlo 1x při náhodném nechráněném styku, 1x při nechráněném styku se stálým partnerem a 1x cesta přenosu ani sexuální chování nezjištěno.

Analýza dat je uvedena v tabulkách č. 1 – 12 a v grafech č. 1 – 13.


**Počet hlášených pohlavních nemocí
dle pohlaví ve Středočeském kraji
v letech 2005 - 2014**

tabulka č. 1

rok	syfilis			gonokokové infekce		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
2005	19	20	39	61	37	98
2006	25	15	40	64	31	95
2007	43	25	68	63	31	94
2008	55	33	88	63	23	86
2009	56	43	99	43	20	63
2010	76	39	115	44	26	70
2011	50	31	81	53	31	84
2012	47	29	76	73	26	99
2013	44	25	69	98	33	131
2014	65	22	87	96	25	121


**Syfilis
vývoj počtu hlášených onemocnění ve Středočeském kraji
dle pohlaví v letech 2005 - 2014**

graf č. 1



Gonokokové infekce
vývoj počtu hlášených onemocnění ve Středočeském kraji
dle pohlaví v letech 2005 – 2014

graf č. 2




Syfilis ve Středočeském kraji
počet hlášených onemocnění dle jednotlivých forem za posledních 10 let a nemocnost

tabulka č. 2

rok	Syfilis - absolutní počet onemocnění					nemocnost na 100 000 obyvatel	
	vrozená	časná	pozdní	jiná a NS	celkem	časná	celkem
2005	0	13	21	5	39	1,2	3,5
2006	0	12	18	10	40	1,1	3,5
2007	0	41	15	12	68	3,5	5,9
2008	0	51	19	18	88	4,4	7,6
2009	0	71	11	17	99	5,9	8,2
2010	0	77	7	31	115	6,2	9,2
2011	0	47	14	20	81	3,8	6,5
2012	0	38	16	22	76	3,0	5,9
2013	0	48	13	8	69	3,8	5,4
2014	0	61	15	11	87	4,7	6,7


**Syfilis ve Středočeském kraji
nemocnost celková a z toho časná
v letech 2005 – 2014**

graf č. 3




**Syfilis ve Středočeském kraji
rozdělení dle forem (počet onemocnění)
v letech 2005 - 2009**

graf č. 4



**Syfilis ve Středočeském kraji
rozdělení dle forem (počet onemocnění)
v letech 2010 - 2014**

graf č. 5




Gonokokové infekce Středočeský kraj
počet hlášených onemocnění včetně nemocnosti
v letech 2005 – 2014

tabulka č. 3

rok	absolutní počet onemocnění	nemocnost na 100 000 obyvatel
2005	98	8,7
2006	95	8,3
2007	94	8,1
2008	86	7,4
2009	63	5,2
2010	70	5,6
2011	84	6,7
2012	99	7,7
2013	131	10,2
2014	121	9,4

Gonokokové infekce Středočeský kraj
nemocnost v letech 2005 – 2014

graf č. 6



**Počet hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle okresů v roce 2014**

tabulka č. 4

okres	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venereum		ulcus molle	
	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost
Benešov	3	3,1	7	7,3	-	-	-	-
Beroun	11	12,6	5	5,7	-	-	-	-
Kladno	14	8,8	20	12,5	-	-	-	-
Kolín	6	6,2	10	10,3	-	-	-	-
Kutná Hora	3	4,0	2	2,7	-	-	-	-
Mělník	5	4,8	5	4,8	-	-	-	-
Mladá Boleslav	7	5,6	14	11,2	2	1,6	-	-
Nymburk	6	6,3	8	8,4	-	-	-	-
Praha východ	12	7,7	24	15,4	-	-	-	-
Praha západ	16	12,5	14	10,9	-	-	-	-
Příbram	4	3,5	8	7,0	1	0,9	-	-
Rakovník	-	-	4	7,2	-	-	-	-
celkem	87	6,7	121	9,4	3	0,2	0	0,0

Počet hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji dle jednotlivých okresů a jednotlivých diagnóz rok 2014

tabulka č. 5

Kód dle MKN-10	diagnóza	okres												celkem	rok 2013 celkem
		BN	BE	KL	KO	KH	ME	MB	NB	PH	PZ	PB	RA		
Vrozená syfilis															
A50.0 – A50.9	vrozená syfilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
Časná syfilis															
A51.0	primární genitální	2	1	4	-	-	1	-	1	1	3	-	-	13	8
A51.1	primární řitní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A51.2	primární jiných lokalizací	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	0
A51.3	sekundární kůže a sliznic	1	5	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	13	14
A51.4	jiná sekundární	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	0
A51.5	časná, latentní	-	1	2	3	-	2	-	-	1	3	1	-	13	13
A51.9	časná, NS	-	1	2	-	-	-	-	2	5	6	-	-	16	13
Pozdní syfilis															
A52.0	kardiovaskulární syfilis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
A52.3	neurosyfilis NS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0
A52.8	pozdní, latentní	-	-	5	-	-	1	-	-	2	-	2	-	10	7
A52.9	pozdní, NS	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	4
Jiná a neurčená syfilis															
A53.0	latentní, neurč. pozd.	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	7	4
A53.9	NS	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	3
Gonokokové infekce															
A54.0	dol. pohl. ú. bez abscesu	6	3	15	9	2	5	14	8	23	11	7	3	106	112
A54.1	dol. pohl. ú. s abscesem	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
A54.3	oka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
A54.5	gonokoková faryngitida	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	6
A54.6	řiti a rekta	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	6	6
A54.9	gonokoková infekce, NS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
A55	Lymphogranuloma venerum	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	0
A57	Chancroid – ulcus molle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
celkem absolutně 2014		10	16	34	16	5	10	23	14	36	30	13	4	211	
nemocnost /100 000 obyv.		10,4	18,4	21,3	16,4	6,7	9,6	18,5	14,7	23,1	23,4	11,4	7,2	16,3	
celkem absolutně 2013		6	6	27	14	15	18	22	11	40	22	16	3		200


**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkových skupin včetně specifické nemocnosti
rok 2014**

tabulka č. 6

věková skupina	syfilis		gonokokové infekce	
	absolutní počet	specifická nemocnost	absolutní počet	specifická nemocnost
0	0	0,0	0	0,0
1-4	0	0,0	0	0,0
5-9	0	0,0	0	0,0
10-14	0	0,0	0	0,0
15-24	12	8,7	43	31,3
25-34	33	17,6	48	25,6
35-44	26	11,9	23	10,5
45-54	7	4,4	3	1,9
55-64	6	3,4	3	1,7
65+	3	1,5	1	0,5
celkem	87	6,7	121	9,4

**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí
ve Středočeském kraji dle věkových skupin
rok 2014**

graf č. 7




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a pohlaví (občané ČR včetně cizinců)
rok 2014**

tabulka č. 7

věková skupina	syfilis			gonokokové infekce		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
0	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-24	6	6	12	29	14	43
25-34	28	5	33	41	7	48
35-44	21	5	26	20	3	23
45-54	4	3	7	2	1	3
55-64	4	2	6	3	0	3
65+	2	1	3	1	0	1
celkem	65	22	87	96	25	121


**Syfilis ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a pohlaví (občané ČR včetně cizinců)
rok 2014**

graf č. 8



**Gonokokové infekce Středočeský kraj
dle věkové skupiny a pohlaví (občané ČR včetně cizinců)
rok 2014**

graf č. 9




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a etnika
rok 2014**

tabulka č. 8

věková skupina	syfilis			gonokokové infekce		
	občané ČR	cizinci	celkem	občané ČR	cizinci	celkem
0	0	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-24	11	1	12	40	3	43
25-34	27	6	33	43	5	48
35-44	18	8	26	22	1	23
45-54	4	3	7	1	2	3
55-64	4	2	6	3	0	3
65+	2	1	3	1	0	1
celkem	66	21	87	110	11	121


**Syfilis ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a etnika
rok 2014**

graf č. 10



**Gonokokové infekce Středočeský kraj
dle věkové skupiny a etnika
rok 2014**

graf č. 11




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti se sexuálním zaměřením nemocných
rok 2014**

tabulka č. 9

sexuální zaměření	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venerum		celkem	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
heterosexuál	40	46,0	87	71,9	-	-	127	60,2
homosexuál	30	34,5	26	21,5	3	100,0	59	27,9
bisexuál	10	11,5	6	5,0	-	-	16	7,6
jiné	-	-	2	1,6	-	-	2	1,0
nezjištěno	7	8,0	-	-	-	-	7	3,3
celkem	87	100,0	121	100,0	3	100,0	211	100,0

**Procentuální znázornění vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti se sexuálním zaměřením nemocných rok 2014**

graf č. 12




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti s HIV infekcí
rok 2014**

tabulka č. 10

HIV	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venerum		celkem	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
pozitivní	13	14,9	8	6,6	2	66,7	23	10,9
negativní	52	59,8	101	83,5	1	33,3	154	73,0
nezjištěno	22	25,3	12	9,9	-	-	34	16,1
celkem	87	100,0	121	100,0	3	100,0	211	100,0

**Procentuální znázornění vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti s HIV infekcí rok 2014**

graf č. 13



**Přehled hlášených pohlavních nemocí v roce 2014 dle pohlaví a epidemiologické anamnézy
Středočeský kraj**

tabulka č. 11

Kód dle MKN-10	diagnóza	muži	ženy	z toho gravidita	zdroj znám	kontakty ano	kontakty ne
Časná syfilis							
A51.0	primární genitální	12	1	1	4	6	7
A51.1	primární řitní	-	1	-	1	-	1
A51.2	primární j. lokalizací	1	1	-	-	-	2
A51.3	sekundární kůže a sliznic	12	1	-	-	5	8
A51.4	jiná sekundární	3	-	-	1	2	1
A51.5	časná, latentní	11	2	-	6	7	6
A51.9	časná, NS	13	3	1	6	9	7
Pozdní syfilis							
A52.0	kardiovaskulární		1	-	-	1	-
A52.3	neurosyfilis NS	1	-	-	-	1	-
A52.8	pozdní, latentní	3	7	3	-	9	1
A52.9	pozdní, NS	1	2	1	-	2	1
Jiná a neurčená syfilis							
A53.0	latentní, neurč. pozd.	5	2	-	1	-	7
A53.9	NS	3	1	1	-	2	2
celkem		65	22	7	19	44	43
Gonokokové infekce							
A54.0	dol. pohl. ú. bez abscesu	84	22	-	20	39	67
A54.1	dol. pohl. ú. s abscesem	-	1	-	-	-	1
A54.5	gonokoková faryngitida	5	2	-	-	-	7
A54.6	řiti a rekta	6	-	-	-	-	6
A54.9	gonokoková infekce, NS	1	-	-	-	-	1
celkem		96	25	0	20	39	82
celkem		161	47	7	39	83	125

**Vývoj počtu hlášených onemocnění pohlavními nemocemi v letech 2005 – 2014
porovnání v České republice a ve Středočeském kraji**

tabulka č. 12

rok	syfilis Stč. kraj		syfilis ČR		gonokokové Stč. kraj		gonokokové ČR		lymphogr. v. Stč. kraj		lymphogr. v. ČR		ulcus molle Stč. kraj		ulcus molle ČR	
	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.
2005	39	3,5	523	5,1	98	8,7	859	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	40	3,5	502	4,9	95	8,3	1082	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	68	5,9	822	8,0	94	8,1	1149	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	88	7,6	850	8,1	86	7,4	816	7,8	-	-	1	0,0	-	-	-	-
2009	99	8,2	997	9,5	63	5,2	724	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	115	9,2	1022	9,7	70	5,6	756	7,2	-	-	1	0,0	-	-	-	-
2011	81	6,5	737	7,0	84	6,7	709	6,8	1	0,1	6	0,1	-	-	-	-
2012	76	5,9	696	6,6	99	7,7	1151	11,0	2	0,2	9	0,1	-	-	-	-
2013	69	5,4	710	6,7	131	10,2	1421	13,5	-	-	*		-	-	*	
2014	87	6,7	*		121	9,4	*		3	0,2	*		-	-	*	

*počet onemocnění nebyl v době zpracování této zprávy k dispozici